

接種後の注意事項

◎3回目の接種の安全性と効果

安全性

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

発現割合	ファイザー社(2回目→3回目接種後の症状)	武田/モデルナ社(2回目→3回目接種後の症状)
50%以上	疼痛(78.3→83.0%)、疲労(59.4→63.7%)	疼痛(88.3→83.8%)、疲労(65.4→58.7%) 頭痛(58.8→55.1%)
10 - 50%	頭痛(54.0→48.4%)、筋肉痛(39.3→39.1%) 悪寒(37.8→29.1%)、関節痛(23.8→25.3%)	筋肉痛(58.1→49.1%)、関節痛(42.9→41.3%) 悪寒(44.3→35.3%)、リンパ節症(14.2→20.4%)
1 - 10%	38度以上の発熱(16.4→8.7%) 腫脹(6.8→8.0%)、発赤(5.6→5.9%) リンパ節症(*) (0.4→5.2%)	38度以上の発熱(15.5→6.6%) 腫脹・硬結(12.3→5.4%) 紅斑・発赤(8.7→4.8%)

(注) 対象/人数：ファイザー2回目 16～55歳/2,682人、ファイザー3回目 18～55歳/289人、モデルナ2回目 18歳以上/14,691人、モデルナ3回目 18歳以上/167人

(注) 2回目接種と比べた3回目接種での発現割合： 5ポイント以上少ないもの、 5ポイント以上多いもの。

(注) 武田/モデルナ社のワクチンは、1・2回目は100μg、3回目は50μg接種している。

(※) ファイザー社のワクチンのリンパ節症は、接種後1か月以内のデータを記載。

出典：特例承認に係る報告書より

効果

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

■下記の場合は、速やかに接種医、かかりつけ医などの身近な医療機関の診察を受けてください

○強い痛み・腫れ、高熱などの症状がある場合。

○概ね3日程度症状が改善されない場合。

※ワクチン接種後、ごくまれに心筋炎、心膜炎の発症事例が報告されています。

心筋炎または心膜炎の初期症状(胸痛、動悸、むくみ、呼吸困難、頻呼吸等)がみられた場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

■ワクチン接種後の相談先

相談内容	相談先	電話番号
ワクチンの副反応等に関すること 副反応発生時の受診に関すること	北海道新型コロナウイルス ワクチン接種相談センター (9:00～17:30)	0120-306-154
休日、夜間などに、緊急で受診の 相談をしたい場合	救急安心センターさっぽろ (24時間対応)	#7119又は 011-272-7119
その他ワクチン接種に関すること	札幌市新型コロナウイルス ワクチン接種お問い合わせ センター (9:00～18:00)	011-351-8646

裏面についても必ずご覧ください。

■ワクチンを接種してからの過ごし方

- ☑ 注射した部分は清潔に保つようして下さい。
- ☑ 接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようして下さい。
- ☑ 当日の激しい運動や過度の飲酒等は控えて下さい。

ワクチンを受けた後も

マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします

ワクチンを受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、他の方への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。また、ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、すぐに多くの方が予防接種を受けられるわけではなく、ワクチンを受けた方も受けていない方も、共に社会生活を営んでいくことになります。

このため、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。

感染予防対策の具体例



密集場所



密接場面



密閉空間

「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避



マスクの
着用



石けんによる
手洗い



手指消毒用
アルコールによる
消毒の励行